



## IMPORTANTE

En caso de una relación sexual sin consentimiento (violencia/abuso) usá pastillas de emergencia y acudí al servicio de Salud más cercano.

## TENER EN CUENTA

- Si presenta vómitos dentro de las primeras dos horas después de tomar las píldoras, es necesario volver a tomar la misma dosis.
- Las pastillas de emergencia no protegen contra las infecciones de transmisión sexual ITS.



UNA BUENA  
ASESORÍA TE  
AYUDARÁ A TOMAR LA  
MEJOR DECISIÓN

## ¡ASEGURATE DE TENER TODA LA INFORMACIÓN!

### ASUNCIÓN

Avda. Perú 1284 c/ Ana Díaz. EDIFICIO CEPEP  
(0982) 283 275

### SAN LORENZO

Hernandarias 1775 c/ Julia Miranda Cueto de Estigarribia  
(0985) 600 473

### CIUDAD DEL ESTE

Avda. Emeterio Miranda esq. Camilo Recalde. PREMIER II  
(0985) 600 474

### LUQUE

Avda. Humaitá 34 entre Cerro Corá y 14 de mayo  
(0985) 600 475

### ENCARNACIÓN

Av. Carlos Antonio López 852 c/ Gral. Cabañas  
(0986) 824 843



[www.cepep.org.py](http://www.cepep.org.py)

**#PromoviendoDerechos**

## PASTILLA ANTICONCEPTIVA DE EMERGENCIA

# PASTILLA DE EMERGENCIA



**Clínica  
de la Familia**  
Calidad en Salud




## ¿QUÉ ES?

Es un método de prevención del embarazo no planificado utilizado en situaciones de emergencia (relación sexual sin protección o violencia/abuso sexual).

### TIPOS DE PASTILLAS

- Píldoras de levonorgestrel.
- Acetato de ulipristal.



## ¿CÓMO SE TOMA?

### Píldoras de levonorgestrel:

- **Caja con un comprimido de 1,5 mg:** Se toma un comprimido en dosis única.
- **Caja con dos comprimidos de 0,75 mg:** Se puede tomar ambos comprimidos en una toma, o tomar un comprimido cada 12 horas.

### Acetato de ulipristal

Tomar una píldora. Dosis única.

## ¿CÓMO ACTUA?

### Depende del momento del ciclo menstrual;

- Antes que ocurra la ovulación: Inhibe o retrasa.
- Después que ocurra la ovulación: Altera la consistencia del moco cervical (lo vuelve más espeso) impidiendo el paso de los espermatozoides.



## ¿CUÁNDO USAR?

- Después de una relación sexual sin protección.
- Si se presentan situaciones de riesgo o no se usa correctamente el método anticonceptivo.
- Lo antes posible dentro de las primeras 72 horas.